

麻しん風しん混合(MR)ワクチン

【はしか】【ふうしん】

接種を受けた後の注意

監修／宮崎千明 先生(福岡市社会福祉事業団 医療主幹)

岡田賢司 先生(福岡看護大学／福岡歯科大学医科歯科総合病院予防接種センター 教授)

1

● 予防接種を受けた後30分以内に、まれに急な副反応が起こる場合がありますので、お子様の様子をよく観察してください。接種後30分程度は医療機関またはその近くにいるか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。



2

● 接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。

3

● 副反応の主なものは発熱と発疹です。
● 他の副反応として注射部位の発赤、腫脹(はれ)、硬結(しこり)などの局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、熱性けいれんなどがみられることがあります。
● また、まれにショック、アナフィラキシー、けっしょうばんげんしょうせい血小板減少性
● しはんびょう きゅうせいさんざいせい紫斑病、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、けいれんけいれんなどの副反応が生じる可能性があります。

裏面も必ずお読みください。



4

- 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は可能ですが、接種部位をこすことはやめましょう。



5

- 次の接種でロタウイルスワクチン以外の他の生ワクチン（水痘、おたふくかぜなど）を接種をする場合は「27日以上の間隔」をあげてください。次の接種でロタウイルスワクチンおよび不活化ワクチンを接種する場合は決まった接種間隔はありません。また、他のワクチンと同時に接種する場合は医師に相談してください。

6

- 妊娠をしている女性および妊娠している可能性がある女性はワクチンを受けることができません。
- またワクチン接種後は少なくとも2ヵ月間妊娠を避ける必要があります。



7

- 接種後は普段どおりに生活ができますが、接種当日ははげしい運動は避けてください。

8

- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

(公財) 予防接種リサーチセンター「予防接種と子どもの健康2022年度版」から転載(一部改変)

医療機関名



武田薬品工業株式会社