

# 日本脳炎ワクチン

かん そう さい ぼう ばい よう  
〔乾燥細胞培養〕

## 接種を受けた後の注意

監修／宮崎千明 先生 (福岡市社会福祉事業団 医療主幹)

1

予防接種を受けた後30分以内に、まれに急な副反応が起こる場合がありますので、お子様の様子をよく観察してください。接種後30分程度は医療機関またはその近くにいるか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。



2

接種後1週間は副反応の出現に注意しましょう。

3

副反応の主なものは発熱、<sup>がいそう</sup>咳嗽(せき)、<sup>びろう</sup>鼻漏(鼻みず)、注射部位の<sup>こうはん</sup>紅斑などです。またまれにショック、アナフィラキシー、<sup>きゅうせいさんざいせいとうせきずいえん</sup>急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、けいれん、<sup>けつしょうばんげんしょうせいしほんびょう</sup>血小板減少性紫斑病、脳炎、脳症がみられることがあります。接種後の異常な反応や体調の変化があった場合はすみやかに医師の診察を受けましょう。

裏面も必ずお読みください。



4

接種部位は清潔に保ちましょう。  
接種当日の入浴は可能ですが、  
接種部位をこすることはやめま  
しょう。



5

次の接種で他のワクチンを接種  
をする場合、決まった接種間隔  
はありません。また、他のワク  
チンと同時に接種する場合は  
医師に相談してください。



6

接種後は普段どおりに生活ができますが、はげしい運  
動は避けてください。

7

接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった  
場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

(公財) 予防接種リサーチセンター「予防接種と子どもの健康2022年度版」から転載(一部改変)

医療機関名



武田薬品工業株式会社