

びょうきとワクチンシリーズ

水痘

[みずぼうそう]

びょうきとワクチン

監修／尾崎隆男 先生(江南厚生病院こども医療センター顧問)
西村直子 先生(江南厚生病院こども医療センター長)



Vaccine

医療機関名

水痘(みずぼうそう)ってどんな病気?

 すいとう たいじょうほうしん
水痘・帯状疱疹ウイルスの接触感染や空気感染によって感染します。

 通常10~21日の潜伏期ののち発症します。

 主症状は特徴的な発疹でかゆみを伴います。発疹ははじめは斑点状の丘疹、その後3~4日は水疱で、最後はかさぶたになり、治癒します。


 軽度の発熱を伴うこともあります。ふつうは軽症疾患ですが、免疫不全の患者さんなどでは重症化し脳炎が合併することもあります。

 非常に感染力の強い感染症のひとつで、発症した場合はすべての発疹が、か皮化するまで登園、登校は禁止されます。



水痘(みずぼうそう)ワクチンを 接種する年齢は？

【水痘ワクチン定期接種スケジュール】



国立感染症研究所 日本の予防接種スケジュール (2024年4月1日閲覧)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/schedule.html> より引用一部改変

ワクチンを接種する前の注意点

- ✓ 接種当日は朝からお子様の様子をよく観察し、普段と変わったところがないかを確認するようにしましょう。
- ✓ 母子健康手帳と記入済みの予診票を必ず持参しましょう。
- ✓ お子様の日頃の健康状態をよく知っている保護者が付き添うようにしましょう。
- ✓ ご心配な点がありましたら、医師またはお住まいの市町村にご相談ください。
- ✓ 妊娠をしている女性および妊娠している可能性がある女性はワクチンを受けることができません。妊娠可能な女性の場合は、妊娠していないことを確認して接種し、接種後2ヵ月間は妊娠を避ける必要があります。

ワクチンを 接種したあとは？(副反応)

- ✓ 予防接種を受けた後30分以内に、まれに急な副反応が起こる場合がありますので、お子様の様子をよく観察してください。接種後30分程度は医療機関またはその近くにいるか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。



- ✓ 接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。
- ✓ 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は可能ですが、接種部位をこすることはやめましょう。
- ✓ 接種後は普段どおりに生活ができますが、接種当日ははげしい運動は避けてください。
- ✓ 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- ✓ **水痘ワクチンの副反応**
副反応として接種後に発熱、発疹や局所の発赤、腫脹(はれ)、しこりが見られることがあります。まれにアナフィラキシー、けっしょうばんげんしょうせい しほんびょう血小板減少性紫斑病がおきることがあります。



このワクチンを1回受けた方のうち、約20%の人は水痘(みずぼうそう)を発症することがあります。ただし、もし発症しても軽くすむといわれています。



武田薬品工業株式会社