

水痘ワクチン

[みずぼうそう]

接種を受けた後の注意

監修／尾崎隆男 先生(江南厚生病院こども医療センター顧問)

西村直子 先生(江南厚生病院こども医療センター長)

1

予防接種を受けた後30分以内に、まれに急な副反応が起こる場合がありますので、お子様の様子をよく観察してください。接種後30分程度は医療機関またはその近くにいるか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。



2

接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。

3

副反応として接種後に発熱、発疹や局所の発赤、腫脹(はれ)、しこりが見られることがあります。また、まれにアナフィラキシー、けっしょうばんげんしょうせい血小板減少性しはんびょう紫斑病がおきることがあります。そのような症状が出た場合は、医師にご相談ください。



裏面も必ずお読みください。



4

- 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は可能ですが、接種部位をこすことはやめましょう。



5

- 次の接種でロタウイルスワクチン以外の他の生ワクチン(MR、おたふくかぜなど)を接種をする場合は「27日以上の間隔」をあげてください。次の接種でロタウイルスワクチンおよび不活化ワクチンを接種する場合は決まった接種間隔はありません。また、他のワクチンと同時に接種する場合は医師に相談してください。

6

- 妊娠をしている女性および妊娠している可能性がある女性はワクチンを受けることができません。
- またワクチン接種後は少なくとも2カ月間妊娠を避ける必要があります。



7

- 接種後は普段どおりに生活ができますが、接種当日ははげしい運動は避けてください。

8

- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

(公財) 予防接種リサーチセンター「予防接種と子どもの健康2024年度版」から転載(一部改変)

医療機関名



武田薬品工業株式会社